


TYMAI-VIRUSINĖ LIGA

Sergantis žmogus gali užkrėsti aplinkinius 3-5 dienas iki bėrimo ir 4 dienas po bėrimo. Jeigu asmuo nėra sirgęs tymais ir nėra nuo jų skiepytas, tikimybė užsikrėsti po kontakto su sergančiu siekia net 90-95 proc.

PLITIMAS

Plinta kosint, čiaudint, per kvėpavimo takų sekretais suterštas rankas ar daiktus. Virusas yra ypač lakus, plinta oro srautais pastato ribose: koridoriais, laiptinėmis, ventiliacijos kanalais ir pan. Virusas jautrus ultravioletiniams saulės spinduliams, cheminėms medžiagoms, todėl ant įvairių paviršių išlieka gyvybingas iki 2 valandų.

Atmintinė tėvams
Neleisk, kad tymai
sugriautu tavo
planus.



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS



INKUBACINIS LAIKOTARPIS

Trunka 10-12 dienų, rečiau 19-21 dieną. Infekuotas asmuo 4 dienas iki pirmųjų ligos požymių ir pirmas 4-7 ligos dienas tymų virusa išsiskiria į aplinką.

GYDYMAS

Jei pastebėjote, kad vaikas sunegalavo (temperatūra, kosulys, akys bijo šviesos), nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

SIMPTOMAI IR KOMPLIKACIJOS

Simptomai. Staigus karščiavimas (38-39 C), kosulys, sloga, akių junginių uždegimas, jautrumas šviesai. Po 1-2 dienų atsiranda specifinis makulopapulinis bėrimas, kuris neniežti. Pirmieji bėrimo elementai atsiranda ausų, veido kaklo srityje, vėliau išberia liemenį, rankas, šlaunis, blauzdas. Komplikacijos: plaučių, gerklų, ausų uždegimai. Galimas smegenų uždegimas.



Tymai-skiepais valdoma liga

PROFILAKTIKA

Tymai-infekcija, valdoma skiepais. Pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijami 15-16 mėn. ir 6-7 metų vaikai. Įskiepijus dvi tymų vakcinų dozes, pasiekama patikima ilgalaikė apsauga.

SVARBU ŽINOTI!

Skiepai nuo tymų išvengti ligos padeda ir tuomet, jeigu po kontakto su sergančiuoju praėjo ne daugiau nei trys paros. Patikima informacija apie skiepus: www.ulac.lt